

SINDROME DI TOURETTE PLUS IN ETÀ EVOLUTIVA: ANALISI DI 30 PROTOCOLLI RORSCHACH

Tourette Syndrome plus in developmental age: 30 Rorschach protocols analysis

A. Anichini
R. Rigardetto
E. D'Alfio
C. Sirianni
S. Toscano
C. Peirolo
C. Lasorsa
E. Osello
C. Ruffino
P. Massaglia

*Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell'Adolescenza,
Sezione di Neuropsichiatria Infantile, Università di
Torino, AO-OIRM - S. Anna, Torino*

RIASSUNTO

Introduzione. È nota, in letteratura, l'associazione della TS con altri disturbi psicopatologici, come il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), disturbi d'ansia, di personalità, disturbi da deficit di attenzione e iperattività e comportamenti etero- e/o auto-aggressivi. Scopo del presente studio è quello di valutare la presenza di caratteristiche di personalità e/o psicopatologiche di base dei soggetti con TS, al di là della comorbidità specifica, e di esplorare l'importanza e l'utilità del test di Rorschach in questi pazienti.

Materiali e metodi. Il campione clinico in studio è composto da 30 soggetti che hanno ricevuto la diagnosi di "Sindrome di Tourette", secondo i criteri DSM IV TR¹ e diagnosi di "Sindrome di Tourette plus" secondo Robertson² sottoposti a valutazione mediante il test di Rorschach; i punteggi ottenuti sono stati confrontati sia coi valori normativi del test in esame, sia con i risultati ottenuti dal gruppo di controllo, composto da 17 soggetti, presentato in un recente lavoro³, compatibile col nostro campione clinico.

Analisi dei dati. Attraverso l'utilizzo dell'indice statistico *one-sample T test* abbiamo osservato che 6 indici del nostro campione, (R), F+%, G+%, BAN%, A%, H%, mostrano una differenza statisticamente significativa, in confronto ai corrispettivi del campione di controllo; è stato inoltre verificato il rapporto H/Hd+(H)+(Hd).

Conclusioni. In accordo con i dati della letteratura, i soggetti del nostro studio mostrano uno scarso controllo emotivo; ne deriva una scarsa capacità adattiva rispetto ai cambiamenti che l'età evolutiva necessariamente comporta, con difficoltà a mantenere stabilmente un adeguato test di realtà, anche in relazione a un difetto di integrazione della sfera affettiva e cognitiva. Il test di Rorschach appare molto utile, in questa sindrome così sfaccettata, per ampliare lo studio delle *strutture che producono i sintomi*, con le importanti implicazioni terapeutiche e prognostiche che ne derivano.

SUMMARY

Introduction. Today in literature it's well known the association of TS with other psychopathologic problems, such as the Obsessive-Compulsive Disorders (OCD), Anxiety Disorders, Personality Disorders, Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD), self-injury behaviours or aggressive behaviours. The aim of our study is to observe the presence of some personality features or of specific psychopathology disorders in the subjects with TS, independently from their specific comorbidities, and to explore the importance and the utility of the Rorschach test in these patients.

Materials and methods. The clinical sample is composed of 30 subjects with a "Tourette Syndrome" diagnosis according to the DSM-IV-TR criteria¹, and a "Tourette Syndrome [plus]" diagnosis according to Robertson's theory²; these subjects have been assessed by the Rorschach test. The results obtained by this assessment procedure have been compared both to normative values of the test in examination, and to the data obtained by a control group study of a recent work³ composed of 17 subjects compatible in age and sex with our clinical sample.

Data analysis. the statistical index one sample t test shows a significant difference between the clinical sample and the control sample in relation to six parameters of the Rorschach test: Numbers or R, F+%, G+%, BAN%, A%, H%; some others analysis have been made on the ratio H/Hd report+(H)+(Hd).

Conclusions. In agreement with the data of the literature, the subjects of our study show a lacking emotional control; this problem creates a poor adaptive capacity to face the changes that the developmental age necessarily needs, with difficulty to firmly keep a correct reality test, also in relation to a lack in integration of the affective and cognitive dimensions. The Rorschach test seems to be very useful to deepen and articulate the study of the structures that produce the symptoms in this so many-sided syndrome, with some important therapeutic and prognostic implications.

PAROLE CHIAVE

Sindrome di Tourette - Rorschach - Età evolutiva

KEY WORDS

Tourette Syndrome - Rorschach - Developmental age