

ARTICOLO ORIGINALE

Il ritiro sociale grave in età evolutiva: risultati di un'indagine conoscitiva sulle opinioni degli specialisti e le risorse e gli interventi dedicati nei Servizi Italiani di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Severe social withdrawal in the developmental age: results of a fact-finding survey about the experts' opinions, the resources, and the dedicated interventions in the Italian Child and Adolescent Neuropsychiatry Services

M. Serra¹, M. Camuffo², V. Ancona³, D. Candeloro⁴, O. Fuzzi⁵, L.A. Reale⁶, E. Rainò⁷, P. Vizziello⁶

Gruppo di lavoro SINPIA sul Ritiro Sociale Grave:

¹ UOSVD NPIA Asl BAT; Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, Università di Bari Aldo Moro; ² UOC Neuropsichiatria Infantile AUSL Toscana Sudest, Grosseto; ³ Responsabile UOSD, Interventi precoci in Età Evolutiva, ASL Roma 2; ⁴ Asst Lodi; ⁵ AULSS 3 Serenissima, Servizio di NPI Venezia (ret.); ⁶ UOC NPIA, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; ⁷ SC Universitaria di NPI OIRM Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza, Torino

Riassunto

Il gruppo di lavoro della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA), dedicato al ritiro sociale grave in età evolutiva, ha realizzato un questionario finalizzato al mappaggio delle situazioni di ritiro che hanno contattato i Servizi nell'ultimo anno e alla valutazione delle stesse. Il questionario, diviso in due parti, una da compilare una sola volta e una opzionale, da compilare per ciascun ragazzo con le caratteristiche del ritiro sociale grave con cui il compilatore fosse venuto in contatto negli ultimi 12 mesi (dal mese di giugno 2019 al mese di giugno 2020), è stato proposto agli specialisti italiani in tre ondate ravvicinate. Al momento della chiusura dell'indagine (3/12/2020), i questionari parte A ricevuti sono stati 119, a fronte di 136 questionari parte B. Vengono illustrati i risultati dell'indagine e discussi i possibili fattori di rischio, inquadramenti diagnostici, indicatori prognostici e trattamenti.

Parole chiave: ritiro sociale, isolamento sociale, Hikikomori, questionario di rilevazione, pandemia da COVID-19

Summary

The Italian Society of Childhood and Adolescent Neuropsychiatry (SINPIA) created a Working Group dedicated to the study of Severe Social Withdrawal (SSW) in children and adolescents. The Working Group produced an online questionnaire aimed at mapping and evaluating the cases of SSW that contacted the NPIA Services in the last year. The questionnaire was proposed to the Italian Child Neuropsychiatrists by email invitation from July to October 2020. The questionnaire had two independent sections: a first one, about the general characteristics of SSW, to be completed once ("Section A"); a second one, optional, to be completed once for each SSW patient met in the last 12 months (from June 2019 to of June 2020) ("Section B"). At the closing date of the survey (3-12-2020), 119 "Section A" and 136 "Section B" answers had been collected. We illustrate the survey results and discuss possible risk factors, diagnostic frameworks, prognostic indicators, and treatments.

Key words: social withdrawal, social isolation, Hikikomori, questionnaire survey, COVID-19 pandemic

CORRISPONDENZA

Maria Serra, UOSVD NPIA Asl BAT, p.zza Principe Umberto, Barletta - E-mail: maria.serra.13@gmail.com